

# VACUNA DE REFUERZO O DOSIS ADICIONAL ANTE COVID-19: ¿Cuál necesito?



Tal vez tenga preguntas acerca de la diferencia entre un refuerzo de vacuna para el COVID-19 o una dosis adicional (o 3era), y cuál es la correcta para usted. Una dosis adicional (3era) de la vacuna contra el COVID-19 es recomendada para aquellos que tienen un sistema inmune débil (por ejemplo, aquellos que son pacientes con cáncer o han recibido un trasplante de órganos) como una parte regular de la serie de vacunas para el COVID-19. Una dosis de refuerzo es una dosis que es dada a alguien, sin importar que tengan un sistema inmune débil, quienes han completado su serie original de vacunas para ofrecerles una mayor protección. Debido a que la efectividad de la vacuna puede bajar con el tiempo, los refuerzos ayudan a “recargar” su inmunidad e incrementa su protección en contra del COVID-19. ¡Siga el mapa de abajo para ver cuál vacuna es la que necesita para asegurarse de que usted esté protegido óptimamente en contra del COVID-19!

## ¿Cuál vacuna obtuvo originalmente?

**Pfizer**



¿Tiene un sistema inmune debilitado?

**Moderna**



**Si**



**No**



**Novavax**



Dosis adicionales o de refuerzo todavía no están disponibles para aquellos que recibieron Novavax.

**Johnson & Johnson**



¿Tiene un sistema inmune debilitado?

**No me he vacunado todavía**



**Si**



**No**



**¡Vacúnese lo más pronto posible!**

Aquellos mayores de cinco años que han recibido **Pfizer** y aquellos mayores de seis meses que hayan recibido **Moderna** deberán de obtener una **(3era) dosis adicional** de la misma vacuna para el COVID-19 cuatro semanas después de su segunda dosis. Niños de 5 a 11 años que hayan recibido **Pfizer** TAMBIEN deberán de obtener un refuerzo al menos tres meses después de su **(3era) dosis adicional**. Aquellos mayores de 12 años que han recibido **Pfizer** y aquellos mayores de 18 años que han recibido **Moderna** deberán de obtener **2 dosis de refuerzo**, el primer refuerzo al menos tres meses después de su **(3era) dosis adicional**, y el segundo refuerzo al menos cuatro meses después del primer refuerzo.

Todos los mayores de 18 años deberían de obtener una **vacuna de refuerzo** para el COVID-19. Niños de 5 a 17 años que reciban **Pfizer** también deberán de obtener un refuerzo; los refuerzos no están aprobados para niños en este grupo de edades que hayan recibido Moderna. Las personas que reciban a **Pfizer o Moderna** deben de obtener su refuerzo al menos cinco meses después de su segunda dosis. Adultos mayores de 50 años deben de obtener una **dosis de segundo refuerzo** ya sea de Pfizer o Moderna al menos cuatro meses después de su primer refuerzo.

Aquellos mayores de 18 años deben de obtener una **dosis adicional** ya sea de **Pfizer o Moderna** al menos cuatro semanas después de la dosis de J&J, seguidos de **2 dosis de refuerzo** – la primera al menos dos meses después de la segunda dosis y la segunda al menos cuatro meses después del primer refuerzo.

Aquellos mayores de 18 años deben de obtener una **dosis de refuerzo** ya sea una vacuna de **Pfizer o Moderna** al menos dos meses después de su vacuna de J&J. Los adultos mayores de 50 años deben de obtener su segunda dosis de refuerzo ya sea de **Pfizer o Moderna** al menos cuatro meses después de su primer refuerzo. Personas mayores de 18 años quienes hayan recibido dos dosis de J&J pueden obtener un segundo refuerzo ya sea de **Pfizer o Moderna**.