Thật hay giả?
Văc-xin không gây tự kỷ.



Tự kỷ là một phân bình thường của sự đa dạng của con người.

Người mắc chứng tự kỷ suy nghĩ và trải nghiệm thế giới khác biệt so với những người khác. Những khác biệt này có thể bao gồm tương tác xã hội, lời nói và hành vi của một người. Tự kỷ có thể là một chẩn đoán phức tạp nhưng vẫn là một phần bình thường của sự đa dạng trong con người.

Một nghiên cứu gian lận đã làm dấy lên những nghi ngờ kéo dài.

Nhiều lo ngại về mối liên hệ giữa vắc xin và chứng tự kỷ bắt nguồn từ một nghiên cứu do Andrew Wakefield công bố trên tạp chí nghiên cứu The Lancet. Nghiên cứu này bao gồm 12 trẻ em. Nghiên cứu ghi nhận rằng các trẻ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự khác biệt về phát triển ngay sau khi được tiêm vắc xin MMR. Wakefield không thể tìm thấy bằng chứng khoa học rõ ràng về mối liên hệ giữa vắc xin MMR và chứng tự kỷ; tuy nhiên, ông vẫn kết luận rằng không nên sử dụng vắc xin MMR.

Năm 2010, tạp chí The Lancet đã rút lại nghiên cứu này. Tạp chí xác định rằng Wakefield đã có hành vi vi phạm đạo đức trong quá trình thực hiện nghiên cứu của mình. Wakefield đã lấy mẫu máu của trẻ em tại bữa tiệc sinh nhật của con trai mình. Ông cũng cho các trẻ em tham gia nghiên cứu trải qua những thủ thuật xâm lấn không cần thiết. Ngoài ra, ông không công bố rằng mình đã nhận tài trợ từ các bậc phụ huynh vốn đã có sẵn những lo ngại về vắc xin MMR. Hội Đồng Y Khoa Anh đã kết luận Wakefield phạm 30 hành vi sai phạm về đạo đức nghề nghiệp. Ông bị tước giấy phép hành nghề y và không còn được phép hành nghề y.

Nghiên cứu gian lận này đã khiến một số phụ huynh và người chăm sóc mất niềm tin vào vắc xin MMR và từ chối cho con mình tiêm loại vắc xin này. Nghiên cứu này cũng góp phần dẫn đến sự bùng phát trở lại của bệnh sởi trên toàn thế giới. Trong 28 năm kể từ khi nghiên cứu được công bố lần đầu, riêng tại Anh và xứ Wales đã ghi nhận gần 90.000 ca mắc bệnh sởi. Hiện nay, Hoa Kỳ đang ghi nhận số ca mắc bệnh sởi cao nhất kể từ khi căn bệnh này được xem là đã được loại trừ vào năm 1991. Đã có 2.289 ca mắc bệnh được báo cáo trong năm 2025.

Nhiêu nghiên cứu đã chứng minh điêu này sai.

Sau khi nghiên cứu bị làm giả của Wakefield được công bô, môi lo ngại vê`khả năng tôn tại môi liên hệ giữa văc xin và chứng tự kỷ ngày càng gia tăng. Điêu này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu trên khăp thê´giới thực hiện hàng chục nghiên cứu nhăm tìm kiêm bât kỳ môi liên hệ nào giữa văc xin và chứng tự kỷ. Không một nghiên cứu nào trong sô´đó có thể tái lập các kêt quả mà Wakefield đã công bô´hoặc tìm thây bât kỳ môi liên hệ nào giữa văc xin MMR và chứng tự kỷ.

Vấn đề nằm ở thời điểm thích hợp.

Sau khi trẻ được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, phụ huynh và người chăm sóc có thể tự hỏi điều gì đã gây ra chứng tự kỷ ở con mình.

Trẻ em được tiêm văc-xin MMR (sởi, quai bị và rubella) vào khoảng 12 – 15 tháng tuổi. Đây cũng là độ tuổi mà trẻ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu có thể chẩn đoán được của chứng tự kỷ. Do thời điểm tiêm chủng như vậy, người chăm sóc có thể nghĩ rằng văc-xin này có liên quan đến chẩn đoán tự kỷ của con họ.

Từ 1-2 tuổi,

- trẻ bắt đầu nói.
- tương tác xã hội trở nên phức tạp hơn.
- đặc điểm tự kỷ thường trở nên dễ nhận biết hơn.
- trẻ em được tiêm văc-xin MMR liều đầu tiên.

Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng không có mối liên hệ nào giữa bệnh tự kỷ và văc-xin.

Tăng có thể được giải thích bằng cách phát triển chẩn đoán.

Trong 20 năm qua, tỷ lệ trẻ em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ đã tăng lên. Tuy nhiên, các tiêu chí để chẩn đoán chứng tự kỷ và khả năng tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán cũng đã được mở rộng. Hiện nay, nhận thức về chứng tự kỷ đã trở nên rộng rãi hơn so với trước đây. Phụ huynh, giáo viên và bác sĩ sẽ dễ dàng nhận biết các dấu hiệu của chứng tự kỷ hơn và giúp trẻ được chẩn đoán chính xác. Trẻ em được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ ngày nay có thể chưa từng được chẩn đoán như vậy trong quá khứ. Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân gây ra chứng tự kỷ.

Sự gia tăng số ca chẩn đoán tự kỷ đã khiến các nhà nghiên cứu tìm hiểu về nguyên nhân gây ra chứng bệnh này. Các lý thuyết hiện tại cho rằng đó là bệnh di truyền và xuất hiện từ trước khi sinh. Ví dụ, các nghiên cứu về cặp song sinh cho thấy rằng nếu một người trong cặp song sinh cùng trứng được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, khoảng 90% khả năng người còn lại cũng sẽ được chẩn đoán như vậy. Nghiên cứu cũng cho thấy các tác động từ môi trường trong thời kỳ mang thai có thể gây ra chứng tự kỷ. Các nhà nghiên cứu vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các yếu tố khác có thể góp phần gây ra vấn đề này.

May mắn thay, khoa học đã trả lời được câu hỏi liệu vắc-xin hay các thành phần trong vắc-xin có gây ra chứng tự kỷ hay không. Kết quả rất rõ ràng là vắc-xin không gây ra chứng tự kỷ.

Văc-xin MMR an toàn, nhưng sởi là nguy hiểm.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao có thể dẫn đến viêm phổi, viêm não, mất thính lực và tử vong.

Sau một thập kỷ nghiên cứu, chúng ta có thể khẳng định rằng văc xin không gây ra chứng tự kỷ.

Điều này có nghĩa là với tư cách là phụ huynh hoặc người chăm sóc, quý vị có thể yên tâm khi lựa chọn tiêm chủng cho con mình.

Hàng năm ở Hoa Kỳ trước khi tiêm văc-xin MRR,

- sởi bị nhiễm 3 – 4 triệu người Mỹ.
- hàng trăm người chết vì bệnh sởi.
- hàng ngàn người phải nhập viện.
- gần như mọi đứa trẻ đều bị nhiễm bệnh trước 15 tuổi.

IMMUNIZE FOR GOOD

IMMUNIZE COLORADO